

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

Punkční epicystostomie

Punkční epicystostomií rozumíme zavedení katétru (hadičky) z oblasti podbříšku do močového měchýře, s cílem umožnit odtok moče.

Výkon bývá indikován při zástavě močení, pokud nelze zavést cévku močovou trubicí, dále v případě úrazů močové trubice, výjimečně jako trvalé řešení u pacientů s tzv. neurogenním měchýřem, s úrazem páteře a porušením míchy takového rozsahu, že pacient ztratil možnost pohybu dolními i horními končetinami (tzv. kvadruplegie). Tímto zákrokem je možné u kvadruplegie, spojené s dlouhodobým ležením, předejít vzniku proleženiny permanentním katétre zavedeným močovou trubicí.

Punkční epicystostomie je většinou akutní výkon.

Žádná zvláštní příprava před výkonem není nutná. Pokud máte potíže s krevní srážlivostí nebo užíváte léky ovlivňující srážení krve, upozorněte na tuto skutečnost lékaře. Výkon se provádí v místním znecitlivění (nebudete cítit jen oblast v okolí vpichu). Po znecitlivění tkáně se provede krátký řez v podbříšku a zavede se punkční jehla s katétre do močového měchýře, katétr /hadička se fixuje v močovém měchýři speciálním balónkem, ke kůži pak náplastí event. stehy. Katétr je možné napojit na jímací drenáž.

Bezprostřední komplikací přes zvýšenou opatrnost může být krevní sraženina v oblasti vpichu, výjimečně poranění tenkého či tlustého střeva. V těchto případech je určitě nutná operační revize v celkové anestézii. Mezi pozdní komplikace patří neprůchodnost katétru spojená s teplotou, zánětem močových cest, případně drážděním měchýře katétre s projevy nucení na moč.

Alternativou výkonu je katetrizace močového měchýře uretrou, pokud je uretra průchodná.

Výkon trvá do 10 minut. Po výkonu je vhodné dodržování klidového režimu minimálně 24 hodin. Zvýšený příjem tekutin.

Pracovní neschopnost je krátkodobá, 1-2 dny. Každý pacient je po výkonu podrobně poučen sestrou o způsobu ošetřování epicystostomie.

Souhlas nemocného s výkonem:

Prohlašuji, že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl jsem poučen i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl možnost klást lékařovi doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života. Byl jsem informován a vzal jsem na vědomí, že předpokládaného výsledku uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo. Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta.....

Rodné číslo pacienta.....

V Jihlavě dne: Podpis pacienta.....

Podpis lékaře.....