

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

Aplikace botulotoxinu

Vážená paní, vážený pane,

na základě provedených vyšetření Vám byla doporučena aplikace botulotoxinu.

1. Důvod a cíl výkonu

Botulotoxin je specifický enzym, který působí snížení svalového napětí event. svalové síly. Podává se do postižených svalů s cílem zmírnit nepotlačitelné stahy a napětí svalů.

2. Povaha a následky výkonu

Botulotoxin se aplikuje do postižených svalů injekcí.

Botulotoxin normálně působí po dobu 3 až 4 měsíců, dokud nervové zakončení nevytvoří nové signální spojení se svaly. Po této době se musí aplikace pravidelně opakovat

3. Rizika výkonu obecně

Nežádoucí účinky se obvykle objeví během několika prvních dnů po injekci a trvají asi dva dny. Očekává se, že účinná látka oslabí svaly, do kterých byla aplikována. Stejně jako po podání jiných injekcí můžete pociťovat bolest, nebo se v místě vpichu mohou vytvořit podkožní hematomy (modřiny). Vyšší dávka může způsobit slabost i jiných svalů, do kterých nebyla injekce podána, a může se objevit horečka nebo příznaky podobné chřipce.

Nejčastější nežádoucí účinky po injekci do oblasti obličeje:

Pokles horního víčka, mírný zánět rohovky, obtížné úplné zavření oka, nadbytek slz z podráždění, pocit suchých očí a citlivost na světlo, zánět povrchu oka, everse (převrácení vně), inverse (převrácení dovnitř) očních víček, dvojité vidění a jiné poruchy vidění, otok očních víček, vřed na povrchu oka, zvýšení nitroočního tlaku (glaukom), podlitina v měkké tkáni

Nejčastější nežádoucí účinky po injekci do oblasti na krku:

Obtíže při polykání, bolest v místě vpichu, slabost v oblasti krku, chřipkové příznaky, celkový pocit nevolnosti, sucho v ústech, bolest hlavy, ztuhlost, rýma a infekce horních cest dýchacích, dušnost, dvojité vidění, horečka, pokles očního víčka, změny hlasu

Nejčastější nežádoucí účinky po injekci u dětí s dětskou mozkovou obrnou:

Virové infekce a infekce ucha, svalová slabost, močová inkontinence (neschopnost udržet moč), pocit ospalosti, poruchy chůze, malátnost, vyrážka, brnění

Nejčastější nežádoucí účinky po injekci u pacienta po cévní mozkové příhodě:

Podlitina v místě injekce, krvácení, pálení, bolest končetiny, svalová slabost, zvýšení svalového napětí, snížená citlivost, bolest kloubů, slabost, bolest, zánět tíhového váčku (bursitida), zánět kůže (dermatitida), bolest hlavy, reakce přecitlivělosti v místě injekce, malátnost, nevolnost – pocit na zvracení, mravenčení – brnění, pokles krevního tlaku při vstávání do vzpřímené polohy, svědění kůže, vyrážka, porucha koordinace, ztráta paměti, mravenčení okolo úst, deprese, nespavost, otoky končetin, závrať.

Velmi vzácnou komplikací může být i alergická reakce na podanou látku s celkovými projevy, která může v krajním případě až ohrozit pacienta na životě.

4. Režimová opatření po zákroku

Žádná speciální opatření po zákroku nutná nejsou, je možno ihned pokračovat v rozcvičování postižených svalů

Souhlas nemocného s výkonem:

Prohlašuji, že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl jsem poučen i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života. Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta:.....

Rodné číslo pacienta:.....

V Jihlavě dne: **Podpis pacienta:**.....

Podpis lékaře:.....