

## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

### Kontrastní vyšetření páteře

**Vážená paní, vážený pane,**

na základě provedených vyšetření Vám bylo doporučeno provedení perimyelografie.

Jedná se o rentgenové vyšetření páteřního kanálu s kontrastní látkou.

Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.

**Důvodem** k výkonu je vyloučení možného útlaku míchy nebo míšních nervů v oblasti páteře, které nelze prokázat při běžném rentgenovém vyšetření. Jedná se o výkon diagnostický (zjištění příčiny onemocnění), nikoliv léčebný.

#### Příprava k zákroku


Před výkonem podáváme injekci pro uvolnění svalů kolem páteře. Připravte se na následující klidový režim (sprcha, toaleta před výkonem). Jinak výkon nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

#### Způsob provedení

Výkon se provádí vsedě nebo vleže. Dodržují se sterilní podmínky – místo vpichu je dezinfikováno, lékař používá sterilní rukavice a jehlu pro jedno použití. Vpich je veden

v oblasti dolní bederní páteře, kde již není přítomna mícha (**nejedná se o odběr „vzorku z míchy“ !!!!** – viz obrázek). Nakonec je do páteřního kanálu podána jodová kontrastní látka.

Poté se provedou rentgeny páteře, s časovým odstupem 1-2 hodin pak CT páteře (tunel).



#### Režimová opatření po zákroku

Po výkonu doporučujeme klidový režim na lůžku do večerních hodin s lehce zvednutou horní polovinou těla. Pacient chodí pouze na toaletu.

Jako prevenci komplikací doporučujeme zvýšený příjem hypotonických tekutin (cca 3 litry neslazených tekutin -čaj, běžné stolní vody – ne minerálky nebo džusy!).

#### Možné komplikace výkonu a po výkonu

Přes veškerou snahu nemůžeme zaručit nekomplikovaný průběh zákroku.

Bez ohledu na délku výkonu může občas dojít u disponovaných pacientů ke krátké mdlobě (odezví po položení pacienta). Prosíme o Vaše upozornění na dřívější takový stav při lékařských zákrocích. Při výkonu může někdy dojít k vystřelení bolesti do dolní končetiny při podráždění nervu (ustoupí při změně polohy jehly lékařem). I přes dodržení sterilních podmínek může dojít k vzácnému případu zavlečení infekce do mozkomíšního moku z nejasitelného zdroje v těle pacienta. Následující dny po výkonu může u některých pacientů dojít k poklesu tlaku mozkomíšního moku. To se projeví bolestmi hlavy při postavení, event. pocíty na zvracení. Tyto obtíže mohou trvat až několik dní, nejsou pro pacienta ničím nebezpečné, i když jsou nepříjemné. Riziko vzniku těchto obtíží snižuje dodržení režimových opatření po zákroku.

Vzácnou komplikací může být alergická reakce na jodovou kontrastní látku, která může pacienta jako každá alergická reakce na léky ohrozit na životě – **proto je nutné upozornit na jakoukoliv předchozí reakci na jód a kontrastní látku!!!!**

**Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.**

### Souhlas nemocného s výkonem:

Prohlašuji, že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl jsem poučen i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života.

Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.

**Jméno a příjmení pacienta:**.....

**Rodné číslo pacienta:**.....

**V Jihlavě dne:** ..... **Podpis pacienta:**.....

**Podpis lékaře:**.....